

RAZORMIN
(marketingová řada produktů INPORO)
 rostlinný biostimulant

Výrobce: ATLÁNTICA Agricola s.a., Corredera, 33-03400, Villena, Španělsko
Dovozce přípravku: FERTISTAV CZ a.s., T.G. Masaryka 971, 28903 Městec Králové
Dodává: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, 74771 Brumovice, IČ: 25853970

Číslo vzájemného uznání: V850

Složení:

<u>vlastnost</u>	<u>hodnota</u>
celkový dusík (N)	4 %
fosfor ve formě oxidu (P ₂ O ₅)	4 %
draslík ve formě oxidu (K ₂ O)	3 %
bór (B)	0,1 %
měď (Cu)	0,02 %
železo (Fe)	0,4 %
mangan (Mn)	0,1 %
molybden (Mo)	0,01%
Zinek (Zn)	0,085 %
polysacharidy min.	3 %
volné aminokyseliny min.	7 %
organická složka min.	25 %
hodnota pH	4-4,5
Rozpustnost ve vodě: 100%	
Specifická hmotnost: 1,24 g/cm ³	

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v ČR.

Aktivátor vegetativního růstu rostlin doplněný o základní živiny, stopové prvky a komplex stimulačních látek.

Použití:

Pro všechny pěstované plodiny, ošetření osiv, moření osiv a sadby včetně jahodníku před výsadbou.

Máčení osiva a sadby:

brambory	50-70 ml / 100 kg
moření kořenů plodin	4-6 ml/10 l vody
ostatní osivo	2,5-3 ml / 10 kg
cukrovka	70 ml / 100 kg

Přípravek se aplikuje pouze ve formě vodného roztoku.

Listová aplikace: (3-5 ml / 10 l / 100 m²)

řepka ozimá (na podzim 1x)	3-5 ml / 10 l / 100 m ²
cukrovka (2x během vegetace)	3 ml / 10 l / 100 m ²

Závlaha 20-30 ml / 10 l / 100 m²

Uvedenou dávku aplikujeme celkem 2x, a to v intervalu mezi aplikacemi 14 dnů. Poslední aplikaci doporučujeme provést 3-4 týdny před sklizní.

Mísení:

Mísit přípravek s jinými produkty se nedoporučuje.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P270 Při používání tohoto přípravku nejezte, nepijte ani nekuřte.

EUH210 Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Zabraňte styku přípravku s kůží a vniknutí do očí. Při práci použijte ochranné pracovní prostředky pro ochranu rukou, těla, obličeje a očí před potřísněním přípravkem. Při zasažení očí je nutné lékařské ošetření. Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

První pomoc

Všeobecné pokyny: V každém případě se vyvarovat chaotického jednání. Při přetrvávajících obtížích okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO / lékaře. K lékařskému ošetření vždy vzít s sebou originální obal s etiketou.

Při nadýchání: Pokud dojde k zástavě dechu, poskytněte umělé dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zabránit prochlazení a zajistit mu klid. Je-li dýchání nepravidelné nebo se zastaví, zahájit umělé dýchání z plic do plic.

Při styku s kůží: Kontaminované oblečení svlékněte.

Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, pokud je máte nasazené a lze je snadno vyjmout. Oči vyplachujte velkým množstvím čisté a studené vody po dobu alespoň 10 minut, přitom držte víčka od sebe, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Postiženého uložte. NIKDY nevyvolávejte zvracení.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Dekontaminace. Symptomatická léčba.

Pokyny pro bezpečné skladování

Výrobek nevyžaduje speciální způsob uskladnění. Stejně jako při běžných způsobech uskladnění je třeba vyhýbat se tepelným zdrojům, záření a elektrině.

Neskladovat v blízkosti silných oxidačních prostředků, silných kyselin a alkalických látek.

Skladujte v rozmezí teplot +5 až +35 °C na suchém a dobře větraném místě.

Skladujte v souladu s místními předpisy. Dbejte upozornění na etiketě.

Zabraňte styku přípravku s potravinami, nápoji a krmivy.

Způsob likvidace obalů: Prázdné obaly se musí zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

Výrobek se dodává balený.

Objem balení:

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže: